

KOMUNIKAT z dnia 06.07.2007

O ZWALCZANIU ŚLIMAKÓW W UPRAWACH WARZYW ORAZ W OGRODACH DZIAŁKOWYCH I PRZYDOMOWYCH.

W wielu rejonach obserwuje się duże uszkodzenia plantacji warzyw oraz upraw w ogrodach działkowych i przydomowych przez ślimaki. Tam gdzie istnieje duże zagrożenie tych upraw ze strony ślimaków, można je zwalczać stosując jeden z zalecanych preparatów:

MESUROL ALIMAX 02 RB
MESUROL SCHNECKENKORN 04 GB

Środki stosować rzutowo na całej plantacji, pasmowo wokół plantacji lub tylko w miejscach liczniejszego występowania ślimaków. Zabieg wykonać po południu lub wieczorem, najlepiej przed ciepłą wilgotną nocą i słonecznym dniem.

W przypadku masowego występowania ślimaków, tylko na glebę pozbawiona roślin lub na miedzach wokół plantacji i ogrodów można stosować również nawozy o właściwościach parzących jak:

Kainit pylisty w ilości 4 kg na 1 ar
Sól potasowa w ilości 4 kg na 1 ar
Wapno palone pyliste w ilości 4 kg na 1 ar

Nie posypywać liści roślin uprawnych. Zabieg wykonać dwukrotnie wieczorem w odstępie 0,5 godziny stosując jednorazowo połowę zalecanej dawki nawozu.

UWAGA!

Podstawowymi zabiegami ograniczającymi liczebność ślimaków są:

- osuszanie zbyt wilgotnych pól,
- likwidacja siedlisk poprzez usuwanie zbędnej roślinności oraz kompostów, a także stert drewna i kamieni z bezpośredniego sąsiedztwa pól (działek),
- usuwanie z pól (działek) chwastów i wywożenie ich poza obręb bezpośredniego sąsiedztwa,
- prawidłowe zabiegi agrotechniczne: wykonywanie podorywek, orki siewnej, wielokrotne bronowanie pól podczas słonecznej pogody, wczesny i głęboki siew, niszczenie niepożądanego roślinności na plantacjach.

Wojewódzki Inspektor

Andrzej Nowak